

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百五十一

詳校官太醫院醫士臣程泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣朱忻

謄錄監生臣蔣鳳銓

欽定四庫全書

普濟方卷三百五十一 明 周王朱橚 撰

產後諸疾門

語言妄亂

附論

夫人憂愁思慮則傷心心虛故邪從之新產之人內亡津液而血虛志弱使人精神昏亂言語錯謬恍惚不寧甚者變狂癲之證治宜補血益心安神定志則病自愈矣

方

遠志九 治產後血虛或因驚恐神志不寧言語錯謬妄有所見

遠志

去心

甘草

炙

白茯苓

去黑皮

桂

去粗皮

白朮

山

芩

麥門冬

去心焙

人參

當歸

切焙

澤瀉

獨活

去蘆頭

阿膠

炙令燥

菖蒲

各一兩半

乾薑

炮一兩

熟乾地黄

二兩焙

右搗羅為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九煎人

參湯下空心日午夜卧服

人參丸 治產後血虛狂語卧起不安妄有所見

人參

茯神

去木剉

羚羊角

銹炒

芎藭

各一兩

檳榔

剉三兩

桃仁

湯浸去皮尖雙人炒三十個

遠志

去心

桂皮

粗

木香

白芷

各半兩

阿膠皮

一兩

枳殼

去穰麤炒一兩半

右搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九

煎人參湯下空心日午夜卧服

羊腎湯 治產後血虛心氣不足言語謬妄眠卧不

安

羊腎

一對去脂細切以水三升煎至二升澄清

遠志

去心

黃芩

去黑皮

防風

去

白茯苓

去黑皮

人參

獨活

去蘆頭

甘草

炙剉各半兩

芍藥

剉

熟乾地黄

焙各一兩

右除羊腎外粗搗篩每服三錢用腎汁一盞煎至七

分去滓溫服不拘時

茯苓丸

治產後血氣虛神不安言錯謬

白茯苓

去黑心

菖蒲

各一兩半

人參

澤瀉

熟乾地黄

焙
當歸

切焙各
一兩

遠志

去心一
兩一分

麥門冬

去心焙
半兩

桂

去粗

皮一
兩半

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九煎人參湯
下不拘時候

遠志湯 治產後心虛風邪所搏言語妄亂

遠志

去心

赤芍藥

黃芩

去黑心

白茯苓

去黑皮

人參

防風

去叉

獨活

去蘆頭

甘草

炙各一兩

熟乾地黄

焙二兩

右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至七分去滓溫服

不拘時候

茯苓散 療產後狂語志意不定精神昏亂由心氣虛
為風邪所致

茯苓

一方用
茯苓神

生地黃

各一十
二分

遠志

去心

白薇

龍齒

各十
分

防風

人參

獨活

各八
分

右同為末以銀一大觔水一斗五升煎取七升下諸
藥煎取三升溫分三服忌食菰菜猪肉生冷一方治
產後風邪心神恍惚不定加荆芥八分甘草五分

當歸湯 治產後血氣不調言語謬亂

人參

當歸

切焙

芍藥

酸棗仁

去皮

黃芩

去心

白鮮

皮

甘草

炙

剉各一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎七分去滓溫服不拘

時

麥門冬湯

治產後心虛言語謬誤恍惚不安

麥門冬

去心

焙二兩

白茯苓

去黑皮

一兩半

赤芍藥

當歸

切焙

乾人參

甘草

炙

剉各一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

茯苓湯

治產後血虛亂語心志不寧

茯苓

去木

人參

芍藥

剉各一兩半

甘草

炙

當歸

切桂

去粗皮
各一兩

右粗搗篩每服二錢水一盞生薑三片棗二枚劈破煎至七分去滓溫服不拘時一方有茯苓

頭痛

附論

夫頭者諸陽之會也凡產後五臟皆虛胃氣虧弱飲食不充穀氣尚乏則令虛熱陽氣不守上湊於頭陽實陰虛令頭痛又有因產後敗血及氣血虛損風邪客搏經陽注於腦絡不得疏通亦令頭痛也

方

鹿肉湯 治產後風虛頭痛壯熱言語邪僻

鹿肉三觔芍藥 獨活 秦艽 黃芩 黃耆各三兩

半夏一升乾地黄 桂心 芍藥各一兩生薑六兩甘草

阿膠

各一兩

茯苓

千金翼作茯神

人參

各四兩

右㕮咀以水二斗煮肉得一斗二升去肉內藥煎取

三升去滓內膠令烊分四服日三夜一

茯神散 治產後風虛頭痛四肢煩疼口乾微渴

茯神 甘菊花 羌活 當歸

劉微炒

生乾地黄

白芍藥 前胡

去蘆頭

桂心

甘草

炙微赤劉各半兩

葛根

劉三分

石膏

二兩

蔓荊子

一兩

麥門冬

去心焙一兩半

右為粗散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至

六分去滓溫服不計時候

羚羊角散 治產後風虛頭痛身體壯熱言語錯亂

心神煩悶

羚羊角屑 茯神 黃耆劉 人參去蘆頭 防風去

頭 生乾地黄 芎藭各一兩半 麥門冬去心焙 赤芍藥

獨活 秦艽去苗各半兩 石膏二兩 甘草一分炙微赤剉碎

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓不計時候溫服

加減四物湯 治產後頭痛血虛氣弱痰癖寒厥皆令

頭痛一名加減羌活湯

羌活 川芎 防風 香附子炒各一兩 甘草炙 當歸

各五錢 石膏二兩 熟地黃一兩 香白芷 細辛各一兩半

蒼朮一兩六錢去皮

右為粗末每服一兩水煎如有汗是氣弱頭痛也前方中加芍藥三兩桂一兩半生薑煎如頭痛痰癖者加半夏三兩茯苓二兩半生薑煎如熱厥頭痛加白

芷三兩石膏三兩知母一兩半如寒厥頭痛加天麻
三兩附子一兩半生薑煎

白朮散 治產後體虛勞動過多致頭痛熱汗出不止
四肢少力不思飲食

白朮 白茯苓 黃耆 剉各三分 石膏 麥門冬 去心焙各

一兩半 白芍藥 五味子 各半兩 生乾地黄 牡蠣粉

各一人 人參 去蘆頭三分 甘草 五分炙微赤剉

右為粗散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三

枚煎至六分去滓不計時候溫服

石膏散 治產後體虛頭痛煩熱

石膏二兩 當歸剉微炒 羚羊角屑 白芍藥 白朮

子芩 生乾地黄 甘草炙微剉 茯神 前胡

去蘆頭 各三分 麥門冬一兩去心焙

右為粗末散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗二枚煎至六分去滓不計時候溫服

治產後頭疼目暗方

細辛 川當歸 白朮 芍藥

等分

右為末每服二錢白湯點服

治頭痛頭暈

好川芎半兩為末每服二錢薑茶清調下甚捷曾

有一婦人產後頭痛一服愈

麻黃湯 治產後頭痛目眩傷風

麻黃

去根節湯煮掠去沫

葛根

石膏

火煨

桂

去粗皮

附子

炮裂去皮

臍

芍藥

甘草

秦朮

去土

防風

當歸

切焙各一兩

右劉如麻豆每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服
不拘時候

人參散 治產後因傷風冷頭痛壯熱胸膈滿悶不得
睡臥運旋乾嘔不能飲食一名人參煮散

人參

去蘆頭
三分

葛根

劉

酸棗仁

微炒

芎藭

各三分

前胡

去蘆頭
一兩

石膏

二兩

枳殼

麩炒微黃去核

白朮

甘草

炙微赤
劉碎

桂心

各半
兩

右為粗散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎

至六分去滓不計時候一方無生薑煎

防風湯 治產後傷風冷頭目疼痛煩眩惡心

防風

去義

獨活

去蘆頭

黃耆

羚羊角

鑿

枳殼

去穰麩炒

烏頭

炮裂去皮臍

旋覆花

生乾地黄

焙

桂

去粗皮各一兩

右剉如麻豆每服三錢水一盞入生薑三片薄荷三

葉同煎至七分去滓溫服不拘時候

茯苓黃耆湯 治產後風頭痛目昏眩

白茯苓

去黑心

黃耆

剉

菊花

獨活

去蘆頭

枳殼

去穰麩炒

當歸

焙切

生乾地黄

焙

人參

烏頭

炮裂去皮
臍各一兩

右剉如麻豆每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服

不拘時候

羚羊角散

治產後頭目熱痛

羚羊角

鎊

石膏

煨火

當歸

切

芍藥

生乾地黄

白茯苓

去黑皮

麥門冬

去心

前胡

去頭

甘草

炙各一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不

拘時候

黃耆散

治產後虛熱頭痛四肢煩疼不思飲食

黃耆

剉

生乾地黃

麥門冬

焙去心

牡蠣粉

各一兩

桂心

黃芩

甘草

微炙剉各半兩

石膏

二兩

赤芍藥

半兩

右為粗散每服四錢以水一中盞入生薑半分去滓

不計時溫服

前胡散

治產後痰壅頭痛心胸不利少思飲食

前胡

去蘆頭

半夏

湯洗七遍去滑

旋覆花

當歸

剉微炒

甘

菊花

甘草

炙微赤剉碎

赤茯苓

各半兩

石膏

二兩

枳殼

一兩

炒微赤去
穢剉碎

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至
六分去滓不計時溫服

羌活湯 治產後風虛頭痛昏眩

羌活

去蘆頭

當歸

切焙

白茯苓

去黑皮

甘菊花

石膏

煨火

烏頭

去皮臍

甘草

炙剉

芍藥

各一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓不計時

候溫服

防風湯 治產後風熱頭痛目掣動

防風

剉

升麻

黃芩

去黑心

芍藥

石膏

生碎

葛根

剉

芍藥

羌活

各一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓服不計時候

防風葛根湯

療產後風虛頭目痛語言時僻

防風

甘葛

茯苓

各八分

麥門冬

去心八分

芍藥

黃

芩

各六分

犀角

四分

甘草

三兩

右咬咀以水二升煎取七合分為二服

茯苓前胡湯 治產後風頭疼眩悶倒旋

白茯苓

去黑皮

前胡

去蘆頭

菊花

附子

炮裂去皮臍

白朮

細辛

去苗葉

芎藭

麻黃

去根節各一兩

右剉如麻豆每服二錢水一盞煎七分去滓溫服不

拘時候

茯苓湯 治產後氣血虛頭痛不定目眩嘔逆

白茯苓

去黑皮

羌活

去蘆頭

當歸

切焙

人參

芎藭

附

子

炮裂去
皮臍

石膏

火煨
黃耆
剉各
一兩

右剉如麻豆每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服

一方無黃耆名羌活湯

大三五七散 治產後風頭痛風眩口喎耳聾

天麻

炮裂去
皮臍

細辛

去苗葉
各二兩

山茱萸

乾薑

炮裂
五兩

山

芋

防風

去叉各
七兩

右搗羅為散每服二錢清酒調下日再未知稍加

麥門冬湯 治產後虛煩頭疼短氣欲死心下亂不解

麥門冬

去心
二兩

石膏

十二分

淡竹茹

五

小麥

二合

甘草

六分

乾葛

七分

右以水二升煎至八合去滓食後分三服一名淡竹

茹湯

芍藥散

治產後體虛頭痛

白芍藥

生乾地黄

牡蠣粉

各一兩

桂心

半兩

甘草

一分炙微
赤剉碎

石膏

二兩

右為粗散每服四錢以水一中盞生薑半分棗三枚

煎至六分去滓不計時候溫服

白殭蠶丸

治產後頭痛

白殭蠶

微炒

白附子

炮裂

地龍

微炒

黃丹

微炒

各一兩

人中白

半兩
炒灰

右為末用葱瀝和丸如梧桐子大不計時候荊芥湯

下十丸

吹鼻方

治產後頭痛

地龍

炒一錢

麝香

半錢

右合研細末每用小豆許吹兩鼻中

川芎散 治產後頭痛一名川烏散

大川芎

真天台烏藥皮

各等分

右為細末每服三錢以秤錘淬酒調服

芎附散 治產後敗血作梗頭痛諸藥不効者

大附子

一枚 醋一盞 醋一盞 用火四畔炙 透 醋令盡 去皮 臍剉碎

川芎

一兩

右為細末每服二錢茶清調下

二奇散 治產後頭痛一名芎藭湯

方見本門 諸疾類

獨活湯 治產後氣虛頭痛不可忍

用大附子一枚炮裂去皮臍剉如麻豆每服三錢
水一盞入生薑三片棗一枚擘同煎至七分去滓
溫服不拘時

吹鼻方 治產後頭痛

用苦葫蘆子搥羅為末吹半字入鼻中其痛立止
偏痛者隨左右吹之

治產後血逆頭痛面赤如醉聞身體如在虛空大腑秘

熱語聲微細須是大腑秘熱方可添大黃喫

黃芩

大黃

杏仁

去皮尖

吉更

牡丹皮

去心

麻黃

去根升麻

羌活

烏藥

防風

荊芥穗

麥門

冬

去心各一分

右為細末每服三錢水一盞薑三片煎一沸食後和

滓喫

治產後大腑秘熱經八九日不通頭痛面赤惡心輕喫些熱物則煩嘔逆宜服此方

杏仁去皮尖 黃芩 木香 羌活 枳殼只用青 獨活

桔梗 貝母去心 大黃 荊芥穗各一兩 連翹子半兩

牽牛二兩 半夏三銖

右為細末每服四錢滴熱水九梧桐子大食後葱湯

下

心腹痛 附論

夫產後心腹痛者由產後氣血俱虛遇寒乘之與血氣相搏隨氣上衝於心或下攻於腹故令心腹痛也若久

痛不止則變成疰瘕也

方

白朮散 治產後冷氣攻心腹疼痛四肢不思飲食

食

白朮

三分

木香

半兩

當歸

剉微炒

陳橘皮

湯浸去白

芍藥

三分

桂心

半兩

人參

去蘆頭

附子

炮裂去皮

厚朴

去粗皮塗生薑

赤芍藥

半兩

甘草

炙微

吳茱萸

湯浸七遍焙

椰

半兩

乾薑

炮裂去皮

厚朴

去粗皮塗生薑

赤芍藥

半兩

甘草

炙微

吳茱萸

湯浸七遍焙

甘草

炙微

吳茱萸

湯浸七遍焙

厚朴

去粗皮塗生薑

赤芍藥

半兩

甘草

炙微

吳茱萸

湯浸七遍焙

右為粗散每服三錢以水一中盞入棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

芍藥黃耆湯 治產後心腹痛

芍藥^{四兩}黃耆 白芷 桂心 生薑 人參 芍

藥 當歸 乾地黃 甘草^{各二兩}茯苓^{三兩}大棗^{十枚}

右咬咀以酒水各五升合煮取三升去滓先食服一

升日三升金翼無人參當歸芍藥地黃茯苓為七

味

芎藭湯 療產後心腹切痛不能飲食之氣忽然而往
來寒熱

當歸 川芎 黃芩 人參 甘草 芍藥

防風 生薑

各三分

大黃

二分可量人強弱方可服之

桃仁

十八

枚

右以水七升煮取二升下大黃更煎三沸分作三服

硝砂丸 治產後腹中有餘血不散致心腹疝痛

硝砂

細研 芫花

醋拌勻微炒令乾各一兩

當歸

劉微炒

赤芍藥

木

香 沒藥

蓬莪茂

狗脊

一分
去毛

白芷

一分

右為末用醪醋一升同熬成膏候可丸即丸如豌豆
大不計時以當歸酒下五丸

羊肉當歸湯 治產後腹中心下切痛不能食往來寒
熱若中風乏氣力

羊肉

二
觔

當歸

黃芩

一方作
黃耆

芍藥

防風

一方作
人參

甘草

各二
兩

芍藥

三
兩

生薑

四
兩

右咬咀以水一斗二升先煮肉熟減半內餘藥取三

升去滓分三服一方以黃耆代黃芩白朮代芍藥名
大羊肉湯一方以桂心代防風加大棗十七枚

澤蘭散 治產後氣力瘦之心腹脹痛

澤蘭

熟乾地黄

各一兩

當歸

剉微炒

赤芍藥

桂心

白朮

芍藥

各三分

甘草

一分炙微赤剉碎

右搗粗羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分
棗二枚煎至六分去滓不拘時候稍熱服

芍藥散

治產後血氣不和心腹疼痛痰逆不思飲食

赤芍藥

當歸

劉微炒

桂心

川椒

去目并閉口者微炒去汗各一

兩

半夏

湯浸七遍去滑

草薺

去皮各三分

甘草

半兩微炒赤剉

右為粗散每服三錢以水一盞入生薑半分棗二枚

煎至六分去滓不計時候稍熱服

當歸散 治產後氣血不散心腹刺痛脹滿喘促

當歸

劉微炒

白朮

各三分

木香

劉微炒

鬼箭羽

各一兩 桂心

剉半兩

右為粗散每服三錢以水一中盞入生薑半分生地

黃一分煎至五分次入酒一小盞更煎三兩沸去滓
稍熱服

桂心散 治產後惡血未盡心腹疼痛

桂心一兩水蛭微炒牡丹 延胡索 硫黃細研各半兩

右搗細羅為散不計時候以溫酒調下一錢

芫花散 治產後心腹疼痛不可忍

芫花醋拌炒沒藥各一兩硃砂細研當歸剉微炒硫黃各半兩

一分
細研

右搗細羅為散不計時候以熱酒調下一錢

木香散 治產後內傷冷氣腹中及心下切痛不能飲

食四肢無力

木香 芎藭 赤芍藥 白朮 青橘皮

去蘇白湯浸各

三當歸 一兩半 甘草 炙微 高良薑 劉各 厚朴 一分

去粗

皮塗生薑汁

炙令香熟

右搗粗羅為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候稍熱服

桃仁散 治產後敗血不散上衝心腹痛不可忍

桃仁

湯浸去皮尖雙人麤炒微黃

桂心

各半兩

蓬莪茂

三錢

當歸

一兩

劉微炒

右搗羅為散不計時候熱酒調下一錢

定痛散 治產後心腹疼痛不可忍

當歸

劉微炒

赤芍藥

芍藥

各一兩

右搗細羅為散不計時候以熱生薑酒調下一錢

治產後心腹痛

生地黃汁 藕汁 童子小便

各三合

右同煎三五沸分溫三服

蓬莪茂丸 治產後心腹有宿冷疼痛

蓬莪茂

兩一

五靈脂

兩三

鰾醋

升一

右搗羅為末以醋熬為膏候可丸即丸如梧桐子大
不計時候以懷香湯或熱酒下十九

失笑散 治產後心腹痛欲死百藥不効服此頓愈

五靈脂

酒研淘去砂土

蒲黃

各等分

右為末先用醞醋調二錢熬膏入水一盞煎至七分食前熱服

茱萸酒 治產後心腹內外痛

用吳茱萸一升以酒三升煎取一升空心溫二服

治產後心腹痛

產後心腹痛 不解慢恟惶 鷄蛋酒調下

止痛了尋常

心痛 附論

夫產後心痛者蓋心者血之主人有伏冷宿寒因產臟
虛遇風寒客之與血氣相搏血凝不得消散其氣遂上
衝擊於心之絡脉故心痛但以大巖密湯治之寒去則
血脈溫而經絡通心痛自止若誤以為所傷治之則虛
極寒益甚矣心痛乍歇乍甚心之支別絡為邪所傷也
若邪傷心之正經心絡寒甚則變為真心痛朝發夕死
夕發旦死所以然者心為諸藏之主不受邪傷邪傷即
死藥不可輕用也

方

大巖蜜湯

治產後心痛氣虛宿冷搏血上冲心絡非

真心痛也

生乾地黄

一作熱

當歸

獨活

吳茱萸

芍藥

乾薑

甘草

桂心

朝浩不用桂心獨活甘草

小草

各一兩

細辛

半兩
兩蜜

一升千金方用五合千金翼不用蜜

右為散每服半兩水三盞煎至一盞去滓稍熱服。

評曰產後心痛雖非產蓐常疾痛或有久痛未必便

是血痛設是巖蜜湯豈可用熟地黃熟地黃泥血安能
去痛此方本出千金用生乾地黃耳茱萸一方合準五
兩乾薑三兩細辛却停寒在下焦方本一兩却減半兩
制竒制偶量病淺深自有品數不可妄意加減然以巖
蜜湯治血痛不若失笑散用之有效一方無甘草蜜
蜀椒湯 療產後心痛此大寒所為

蜀椒二合芍藥三兩半夏二兩當歸二兩桂心二兩人參二兩甘草二兩

一分炙二兩茯苓二兩生薑汁五合蜜一升
微赤炒二兩

右切以水九升煮椒令沸下諸藥煮取二升半去滓下薑汁蜜等更煎取三升一服五合至六合禁勿冷食

熟乾地黄散 治產後血氣上攻心痛四肢厥冷不納飲食

熟乾地黄

一兩

當歸

三分剉

白朮

半兩

甘草

一分炙剉

桂心

赤芍藥 小草

細辛

芎藭

各半兩

吳茱萸

一分湯浸七遍

焙乾
微炒

右為粗散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時

候溫服

青橘皮散 治產後血氣攻心痛

青橘皮

湯浸去瓢焙乾三分剉

木香 蓬莪茂

烏藥

各三分

乾

薑

半兩炮裂剉

桂心

當歸

桃仁

湯浸去皮尖雙人麤炒微黃各一兩

紫蘇子

三分微炒

右搗細為散以熱酒調下二錢

當歸散

治產後血刺連心疼痛

當歸

一兩剉微炒

胡椒

一分

蓬莪茂

木香

各半兩

白朮

三分

右為細散不計時候以熱酒調下一錢

芎藭散 治產後血氣與冷氣相搏上心攻痛

芎藭 桂心 木香 當歸

劉微炒

桃仁

湯浸去皮尖雙人麤

炒微黃
各半兩

右搗細羅為散不計時候以熱酒調下一錢

桂心散 治產後血氣衝心疼痛

桂心 芫花 木香

各一兩

香墨

二挺

右為末以醵醋二升先煎芫花為膏次入木香并墨桂和丸如梧桐子大每服以熱酒下十九

吳茱萸散 治產後血氣衝心悶絕疼痛

吳茱萸

湯浸七遍
乾微炒

丁香

當歸

劉微炒
各半兩

熟乾地

黃

一兩

右搗細羅為散不計時候以熱酒調下二錢

雲臺子散 治產後血氣衝心痛

雲臺子

微炒
當歸
劉微炒
各一兩

右搗細羅為散不計時候以熱酒調下一錢

治產後心疼

用布裹鹽如彈丸大燒作灰酒服愈

又方

燒秤錘投酒中服之佳

又方

燒大豆投酒中服佳

桂心酒 治產後疼痛及卒心痛

用桂心三兩以酒三升煮取二升去滓分三服日三
治產後餘疹刺痛三十六候

以銅鏡鼻七枚投醋中熬過呷之亦可入當歸芍藥服之

治產後急心疼欲死大腑熱時依此方喫大腑虛冷請減半夏牽牛二味不要喫也

延胡索一兩芎藭一兩當歸 芍藥 蓬莪茂 木香

吳茱萸 官桂去皮牛膝 牽牛各一分半夏二銖

右細杵羅為末每服三錢土器內煎一兩沸和滓喫治產後血刺心痛欲死

用燂猪湯取一盞溫服之

治產後血攻胸脇刺痛

以蓼蒿煮服之

腹痛

附論

夫產後腹痛者此由產時惡露下少胞絡之間有餘血與氣相擊搏故令腹痛也因重遇於冷則血結變成血瘕亦令水不利也

方

芎藭湯 治產後腹痛

芎藭

甘草

各二兩

蒲黃

萎萎

各一兩半

芍藥

大黃

各三銖

當歸

十八銖

桂心

黃耆

一作黃芩

桃仁

前胡

各一

兩

生地黃

一升

右咬咀以水一斗酒二升合煮取三升去滓分四服
日三夜一服

芎藭湯 療先患冷氣因產後腹痛

芎藭

桂心

當歸

吳茱萸

茯苓

芍藥

甘草

各六分
桃仁十

右咬咀以水七升煮取二升去滓分溫三服

當歸黃耆湯 治產後餘疾腹中絞痛不下食瘦乏

當歸 黃耆

芍藥

各六分

乾地黄

白朮

各八分

桂心

甘草

各四分

棗

十四枚

右咬咀以水二升煮取八合去滓空心作兩大服忌

生葱

羊肉生地黃湯 治產後三日腹痛補中益藏強氣力

消血

羊肉

三觔一方
作白羊肉

生地黄

切二升一方
作熟乾地黄

桂心

當歸

甘草

芎藭

人參

各二兩

芍藥

三兩

右咬咀以水二斗煮取一斗去肉內藥煎取三升分
四服日三夜一服一方治產後虛羸用熟乾地黄

劉寄奴湯

治產後七八日腹痛兩脇痛

劉寄奴

當歸

桔梗

各十分

桂心

陳皮

各四分

茯苓

芍藥

各八分

延胡索

四分
為末

右吹咀以水二升煮取八合調延胡索末空心服

沒藥散 治產後惡血不盡小腹掇撮疼痛

沒藥 赤芍藥 當歸劉微炒 白芷 芎藭 丹皮

各一兩 川大黃劉碎微炒 桂心各一兩半

右搗細羅為散不計時候以熱酒調下二錢

琥珀散 治產後惡血不盡結聚小腹疼痛

湯浸去白紙焙

琥珀 沒藥 赤芍藥 青橘皮 木香

桂心各十兩 當歸劉微炒三分 香附子一兩

右為細散不計時候以豆淋酒調下一錢

桃仁芍藥湯 療產後腹痛惡血未盡

桃仁

半升湯浸去皮尖雙人炒

芍藥

一作赤芍藥

當歸

劉微炒

川芎

乾漆

碎

桂心

甘草

各二兩

右細切以水八升煮取二升半去滓分三服一方有

乾薑三分炮名桃仁散

茯苓散 療產後腹痛氣脹脇下悶不食兼微利

茯苓

人參

當歸

甘草

各六分

生薑

陳皮

各四分

分
厚朴八分

右咬咀以水二升煎取八合去滓分溫服一方有黃芩無生薑為細末以飲調下方寸匕日三服

獨活湯 治產後腹痛引腰背拘急痛

獨活 當歸 桂心 芍藥 生薑

各三兩 甘草二兩

大棗二十枚

右咬咀以水八升煮取三升去渣分溫三服服後相去如人行十里久再進

調中湯 治產後腹痛兼瀉痢由產後腸胃虛冷寒邪所侵若未滿月飲冷物更當風坐卧則被寒邪相乘散入腸中作痛作陣如刀刺及瀉不止腹脇臑脹或走痛不止

當歸

去蘆

肉桂

去粗皮

芍藥

附子

炮

川芎

甘草

炙

良薑

各等分

右為細末每服三錢水一盞煎至八分去滓熱服

評曰產後下痢非止一證當隨所因而調之既云因

冷當風何所不至寒風濕本屬外因喜怒憂思還
從自性沉勞逸饑餓皆致病苦其洞泄可服調中湯
赤白帶下非此能愈各隨門類別有正方今有錄桃
膠散白頭翁湯以備用餘從滯下門選之凡食肉太
早強食過多停滯不化臍腹疼痛而成泄利者誠有
之矣法當消化停滯則愈但不可用牽牛巴豆峻劑
以虛血氣第二問中見現圓最佳倉卒未能辨此用
局方治中湯加縮砂仁煎服一方有人參

芍藥湯 治產後苦腹痛

芍藥

六兩

桂心

三兩

甘草

三兩

生薑

三兩

膠飴

八兩

大棗

十二枚

枝

右呔咀以水七升煮取四升去滓內膠飴令烊分三

服日三

雄黃散 治產後餘血不散致小腹疼痛不可忍

雄黃

水蛭

微炒各一兩

硃砂

細研半兩

麝香

熊膽

各一分

石灰

末二兩

右細研為散不計時候以熱酒調下半錢

鯉魚皮散 治產後惡血未盡結聚腹痛

鯉魚皮灰 亂髮灰 益智子去皮各半兩 蜚蠊微炒

水蛭微炒各一分 當歸劉微炒三分

右搗細羅為散不計時候以熱酒調下一錢

紅藍花散 治產後血不散小腹疼痛

紅藍花 琥珀 蒲黃各一分 當歸劉微炒 沒藥各半兩

桂心三兩

右搗細羅為散不計時候以熱酒調下一錢

當歸丸 治產後腹痛

當歸

劉微
炒

芎藭

赤芍藥

苦練子

礪砂

細研

各一兩 蒲黃

半兩

右為末以醋熬礪砂如錫和丸如梧桐子大不計時候溫酒下十九

延胡索散 治產後臍下痛

釜底墨

醋炒令
乾透

延胡索

劉寄奴 桂心 菴藺子

各等分

右為末以熱酒調下二錢

沒藥散 治產後腹痛

沒藥

乾漆

搗碎炒
令烟出

光花

醋拌炒
令乾

五靈脂

琥珀

各一分

右搗細羅為散不計時候以熱酒調下二錢

麒麟竭散

治產後惡血攻刺小腹疼痛

麒麟竭

芫花

醋拌炒
令乾

延胡索

當歸

剉微炒

硝石

各半
兩

右搗細羅為散不計時候以熱酒調下一錢

又方

鯉魚鱗

燒灰

益母草

燒灰

頭髮

燒灰

當歸

剉微炒

香墨

各一兩

右搗細羅為散不計時候以熱酒調下一錢

又方

劉寄奴

光花

醋拌炒

當歸

剉微炒

桂心

各一兩

右搗細羅為散不計時候以熱酒調下一錢

當歸湯 療腹中絞痛不可忍積血作塊一名四神散

當歸 白芍藥 川芎 乾薑

各等分

右為末每服二錢溫酒調下一方加延胡索炒

羊肉湯 療虛及產後腹中痛虛眩不能支持兩脇

當臍急痛氣上衝前後相引痛

精羊肉

四兩

當歸

川芎

各半兩

生薑

一兩

右細切以水十盞煎至三盞掠去沫去滓分四服空

心熱服一日來再作兩日滓合為一日煎當一劑服

千金當歸湯療婦人寒疝虛勞不足若產後腹中絞
痛無川芎有芍藥陳無擇云仲景羊肉湯治寒疝用
生薑羊肉湯服之無不驗有一婦人產當寒月寒氣入
產門臍下脹滿手不得犯此寒疝氣也醫將治之以
抵當湯謂有瘀血或曰非其治也可服仲景羊肉湯
少減水煎二服遂愈

又方羊肉湯 療產後內虛寒氣入腹腹中絞痛下赤
白痢膿語見鬼

肥羊肉一常歸

甘草

芍藥

各一分一作各一兩

右咬咀以水一斗先煮羊肉取七升入藥更煎取二升

去滓分溫服

桃仁散 治婦人產後血下不盡腹痛不可忍者

桃仁

六十枚

厚朴

一兩

芍藥

一兩

當歸

一兩

右以水三升煎二升分二服未差加錦紋大黃一兩

鯉魚鱗散

治產後腹痛

鯉魚鱗

二兩

亂髮

故緋帛

各一兩

右同入瓶子內以瓦子蓋鹽泥縫漸次着火燒令通赤為度候冷取出細研為散入麴末一兩更同研令勻不計時候以熱酒調下二錢

香桂散 治產後臍腹疼痛不止

川芎

當歸

各一分

桂心

半兩

右為細末分三服每服酒一盞煎三五沸入小便少許煎至七分溫服甚者不過再服

薑黃散 治產後腹痛

川薑黃

二分 沒藥 一分

右為末以水及童子小便各一盞入藥煎至一盞
半分作三服通口服約人行五七里再進一服即止
不過三服便安

療新產後腹中如絃常堅絞痛無聊方

白蜜

一兩 當歸 一兩

右以當歸為末入蜜中煎融三沸適寒溫頓服一方
不用蜜以水煎當歸末服之名獨聖散

當歸散 治產後腹痛脇肋脹滿

當歸 乾薑

各等分

右為末每服三錢水一盞煎至八分入鹽醋少許食前熱服一方用酒煎服

治產後腹痛

天台烏藥

當歸

各等分

右為末炒黑豆淋酒調下二錢

枳實芍藥散 治產後腹痛煩滿不得卧

枳實

燒令黑勿太過芍藥各等分

右為散每服方寸匕日三服并主癰膿以麥粥下之
凡產婦腹痛法當用枳實芍藥散若不愈此為腹中
有乾血著臍下宜服後方瘀血湯主之

瘀血湯

大黃

一兩桃仁二十枚

蟅蟲

三十枚
熬去足

右為末煉蜜和為四丸每用一丸以酒一升煎取八合
頓服之新血下如豚肝

菴蘭子丸 治產後腹痛

菴蘭子

桃仁

湯浸去皮尖雙人麤炒微黃色各用半兩

右搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大不計時候以熱酒下二十九

又方

赤箭

蓬蘽子

微炒各一兩

右搗細羅為散不計時候以熱酒調下一錢

又方

用硃砂一兩細研以醋一升熬成膏別入生硃砂末
一兩九如梧桐子大每服不計時候以熱酒調下五
九如月經不通先宣利過後以熱酒服五九立効

又方

以乾地黄一味炒令烟出狀如石灰搗細羅為散不
計時候煖童子小便一小盞入生薑自然汁半匙調
二錢服

羌活酒 療產後腹痛不止

用羌活四兩切以酒二升煮取一升分服

天仙籐散

治產後腹痛不止及一切血氣腹痛

用天仙籐五兩炒焦為細末每服二錢腹痛炒生薑小便和酒調下血氣溫酒調服

生牛膝酒

治產後腹中苦痛

用生牛膝根五兩以酒五升煮取二升分二服若用乾牛膝根酒清一宿然後可煮

治產後腹痛及血下不盡

用麻黃去根節杵為末酒服方寸匕日二三服血下
盡即止澤蘭湯服亦妙

治產後腹痛

用赤鯉魚燒灰酒調服之兼治血氣一方作鱗

治產後腹痛

用芎藭安產婦腹上則止

治產後六七日忽然腹痛皆由呼吸之間冷氣乘虛而

入宜服後方

用當歸建中湯和四順理中丸共研再丸作小丸飯
飲吞下一方用蜜丸服

治產後未經百日或纔經百日腹痛氣痛轉瀉不止
方

訶子

火炮只
用皮

當歸

各半
兩

五味子

炙艾葉

羌活

白朮

蒼朮

吳茱萸

續斷

肉苁蓉

厚朴

去皮
薑製

牡蠣

火
煨

芎藭

黃芩

各一
分

右為細末煉蜜丸如梧桐子大早晨鹽米湯下五十

九空心服

延胡散 治產後小腹臍下痛

延胡索

桂心

各半兩

當歸

一兩

右為細末熱酒調下

治產後血閉肚痛破宿血止痛

取蟬腳爪以酒及醋湯煎服良

治婦人產後諸血結腹痛內冷不食下血氣

用質汗以酒消服之

治產後腹痛血露不盡

以息王藤濃煮汁服之

治產後腹痛

戶垠下土為末一錢匕酒中熱服之

治產後腹中痼痛

以末桂溫酒服方寸匕日三子母秘錄同

治破血產後腹痛

以鑿菜煮汁服之

治產後身腹中有澀痛及寒勞不足

羊肉一觔

味甘大熱

當歸四兩

味甘辛大溫惡藟茹畏葛蒲海藻牡蛎

生

薑

五兩味辛溫惡黃芩黃連天鼠糞

右三味先以水一斗二升煮肉取七升去肉次入當歸生薑在內煮取三升一服七合三服夜一服

兩脇脹滿

附論

夫產後兩脇脹滿者由膀胱宿有停水因產惡露下不盡水壅痞與氣相搏在膀胱故令兩脇脹滿氣與水

相繫故令痛也

方

陳橘皮散 治產後兩脇脹滿心腹壅悶不思飲食

陳橘皮

湯浸去皮白
瓤焙令乾

赤茯苓

枳實

麩炒
微黃

前胡

去
蘆

頭白朮

厚朴

去粗皮蜜生薑
汁炙令香熟

檳榔

各三
分

木香

人參

去蘆
頭

桂心

芎藭

各半
兩

甘草

一分炙微
赤剉碎

右搗粗羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分

棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

厚朴九 治產後兩脇下及心腹脹滿宿有冷氣攻注

膀胱致使脹痛

厚朴

去粗皮塗生薑汁炙令香熟

京三稜

微火炒

木香

各一兩

赤茯苓

苓

乾薑

炮裂剉

赤芍藥

當歸

剉微炒

陳橘皮

湯浸去白

乾 酥焙

吳茱萸

湯浸七遍焙乾微炒

白朮

各三分

訶黎勒

煨用皮

桂

心

各一兩半

右搗羅為末以醋煮麴糊和丸如梧桐子大每於食

前以生薑湯下三十丸

木香丸 治產後兩脇脹滿小腹疼痛

木香 當歸剉微炒 白朮 芎藭各一兩 白芷 乾薑

炮裂剉 檳榔 芫花醋拌炒令乾 厚朴去粗皮塗生薑汁炙令香熟各半兩

桂心半兩 桃仁三分湯浸去皮尖雙人麩炒令黃

右搗羅為末以醋煮麩糊和丸如梧桐子大每於食前以生薑酒下二十九

當歸散 治產後血氣攻脇肋脹滿疼痛

當歸剉微炒 赤芍藥 桔梗去蘆頭 乾漆搗碎炒 牛膝

白朮 桂心 木香 川大黃

劉碎微炒
各一兩

右搗羅為散每於食前以熱酒調下一錢

桔梗散

治產後兩脇脹滿小腹疼痛不思飲食

桔梗

去蘆頭

當歸

劉微炒

芎藭

各半

大腹皮

三分

桂心

陳橘皮

湯浸去白
瓤焙乾

赤芍藥

赤茯苓

延胡索

各半

兩

右搗粗羅為散每服四錢以水一中盞煎入生薑半

分煎至六分去滓不計時候稍熱服

當歸湯 療產後血氣脇肋脹滿疼

當歸

十分

芍藥

桔梗

檳榔

枳殼

各八分

桂心

青木香

柴胡

各六分

右呖咀以水二升煎取八合去滓空心分溫二服

乾地黃湯

治產後兩脇滿痛兼百病

乾地黃

芍藥

各三兩

當歸

蒲黃

各二兩

生薑

五兩

桂

心

甘草

各一兩

大棗

二十枚

右呖咀以水一斗煮取二升半去滓分服日三

枳實散 治產後兩脇脹滿氣壅煩悶

枳實 麤炒 微黃 木香 當歸 劉微炒 牡丹 各三分 桂心 白

術 益母草 各半兩 檳榔 一兩

右為粗散每服四錢以水一鍾入生薑半分煎至六分去滓每於食前溫服

白芷薤散 治產後臟腑氣虛兩脇脹滿不思飲食四肢無力

白芷薤 去皮 人參 去蘆頭 桂心 各半兩 半夏 湯浸七遍去滑半兩 白

术

陳橘皮

湯浸去白脈
焙乾各一兩

枳殼

三分麩炒
微黃去脈

甘草

一分

炙赤

剉

右搗粗羅每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

厚朴散 治產後兩脇脹滿胸腹妨悶不下飲食

厚朴

一兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟

赤茯苓

人參

去蘆頭

當歸

剉微炒

訶梨勒皮

陳橘皮

湯浸去白脈
焙各三分

甘草

一分
炙微

剉赤

右為粗散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗二枚煎至六分去滓不計時候溫服

白聖散 治產後腹大堅滿喘不能卧

樟柳根

三兩

大戟

一兩半

甘遂

一兩半

右為細末每服二三錢熱湯調下取大便宣利為度此藥主水氣之勝藥也

桂心散

桂心

當歸

剉微炒各一兩

乾薑

剉炮裂

羌活

醋拌炒令乾

木香

各半
兩

右搗細羅為散每服食前以熱酒調下一錢

治產後腹脹腫疼不可忍

用鼠粘根煮為飲一服即愈

治產後膨脹氣不通轉

用麥蘖為末酒調二三錢服之漸通

正勝湯 治產後腹脹滿悶嘔吐不定者何答曰敗血

散於脾胃脾受之不能運化精微成腹脹胃受之則

不得受納水穀而吐逆醫者不識以尋常治脹止
吐藥療之病與藥不相干轉更傷動正氣疾愈難治
但服必瘥

赤芍藥

半夏

湯洗切碎

澤蘭葉

人參

去蘆頭

陳皮

去白

各一錢甘草

炙一錢

生薑

半兩

右為粗末用水一碗同煎至兩盞去滓溫熱分二服
治產後亂吃物早非特腹脇脹滿飲食不快

當歸 鼈甲

以醋少許化研砂少許用炙黃色各一兩

桔梗

細辛

厚朴 羌活 木香 芎藭 檳榔 各一分 草薺 薤

去皮半兩 藿香 三半夏二銖

右為細末每服三錢水一盞生薑二片同煎取九分

空心和水喫

治產後雖甚通利但心腹滿悶脇脹咳嗽不食大便不通
眼澁行坐心腹時痛

白朮 當歸 桑白皮 大黃 各三兩 細辛 桂心

各二兩 生薑 四兩

右咬咀以水二升煎一升分三服當得微利即止大黃產後不可輕用此緣病熱不得已也

身體腰脚疼痛

附論

產後遍身疼痛者蓋由產後百節開張血脈流散遇氣弱則經絡分肉之間血多留滯累日不散則骨節不利筋脈急引故腰背不得轉側手足不能動搖身熱頭痛也若以傷寒治之則汗出而筋脈動惕手足厥冷變生他病但以趁痛散治之若腰脚痛者蓋腎主腰脚

女人腎位繫於胞產則勞傷腎氣損動胞絡虛未平復而風冷客之冷氣乘腰故令腰痛也若寒冷邪氣宿滯背脊則痛久未已後忽有娠必致損動蓋胞絡屬腎腎主腰故也

方

趁痛散 治產後身痛氣弱血滯骨節不利筋脈急引

牛膝 當歸 桂心 白朮 黃耆 獨活 生

薑

兩各半

甘草

薤白

各一分

右咬咀每服半兩以水三盞煎至盞半去滓食前服陳無擇評曰起痛散不特治產後氣弱血滯兼能治太陽經感風頭痛腰背痛自汗發熱若感寒傷食憂恐驚怒皆致身疼發熱頭痛况蓐勞之證尤甚起痛散皆不能療不若和劑局方五積散入醋煎用却不妨又方加桃仁能治腰疼逐敗血祛風濕加桑寄生半兩尤佳

杜仲散 治產後傷虛腰間疼痛四肢少力不能飲食

杜仲

去粗皮炙微
黃色剉碎

熟乾地黃

附子

炮裂去
皮臍

萆薢

剉牛膝

去苗
剉

木香

石斛

去根剉
各一兩

桂心

續斷

各半

兩

五味子

三分

當歸

剉微
炒

芎藭

各三分

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓食前服

石斛散 治產後虛損腰間疼痛四肢無力氣血不和

石斛

去根
剉

丹參

附子

炮裂去
皮臍

延胡索

熟乾地

黃

枳殼

麩炒黃
去瓤

芎藭

桑寄生

各一兩

續斷

當歸

劉微炒各三分

桂心

三分

牛膝

去苗一兩半

右為末煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每服食前以溫酒或生薑湯下三十九

杜仲酒

治產後臍虛腰間疼痛肢節不利

杜仲

去粗皮炙微黃劉二兩

桂心

丹參

當歸

菴藺子

芎藭

牛膝

去苗

桑寄生

附子

炮裂去皮臍

熟乾

地黃

劉各一兩

川椒

半兩去閉口及目微炒

右細劉以生絹袋盛用好酒一斗甕瓶中浸經七日

密封後開取每日空心及午食前溫飲一盞

牡丹湯 治產後腰痛沉重舉動艱難

牡丹皮

柴胡

去苗

犀角

鎊

杜仲

去粗皮剉炒

當歸

切焙

桂

剉去皮

枳殼

去瓤剉炒

檳榔

煨剉

丹參

桔梗

剉炒

郁李人

湯浸

去皮尖
各一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不

拘時候

人參湯 治產後虛冷氣血不和腰痛

人參

當歸

切附子

炮裂去
皮臍

檳榔

生桂
剉皮

甘草

炙厚朴

去粗皮塗
生薑汁炙

鬼箭羽

各一
兩

乾薑

炮

木香

各半
兩

右剉如麻豆大每服三錢水一盞煎至七分去滓溫

服不拘時候

赤芍藥散

治產後血氣壅滯攻刺腰間疼痛

赤芍藥

分三

延胡索

桂心

芍藥

當歸

剉微炒

牡

丹

桃仁

湯浸去皮尖雙
人麤炒各半兩

牛膝

去苗

川大黃

剉微炒
各二兩

枳殼

麤炒微黃
去穰半兩

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至五
分次入酒二合煎三二沸去滓食前溫服

療產後風冷腰痛不可轉者腎經繫於胞脈腎主腰也

獨活 川芎 桂心 芍藥 續斷 生薑 桑

寄生 各六分 當歸 防風 各八分

右咬咀以水三升煮取一升去滓空心分二服

牛膝散 治產後敗血不散攻刺腰間疼痛日夜不止

牛膝 去苗 川大黃

剉碎微火炒各一兩

桂心

赤芍藥

各三分 羚羊

羊角屑

劉寄奴

芎藭

當歸

劉微炒

桃仁

湯浸去皮

尖雙人麤炒
微黃各半兩

右為散每服四錢以水一中盞煎五分次入酒二合

更煎三三沸去滓食前溫服

沒藥散 治產後餘血未盡攻腰悶疼痛

沒藥

牛膝

去苗

桂心

琥珀

赤芍藥

菴藺子

桃仁

湯浸去皮尖雙
人麤炒微黃

狗脊

去毛各
一兩

當歸

劉微炒
半兩

右為細散每服食前以溫酒調下二錢

仙靈脾散 治產後血氣攻刺腰間疼不可忍

仙靈脾

牛膝

去苗

當歸

劉微炒

鬼箭羽

地龍

炒令

黃沒藥

桂心

威靈仙

骨碎補

各半兩

右為細散每服食前以溫酒調下二錢

丹參丸 治產後虛損氣血不和腰痛難忍

丹參

劉續斷

當歸

切焙

牛膝

去苗

酒焙

桂

去粗皮

鬼

箭羽

劉各一兩

沒藥

用醋少許化開半兩

琥珀

右除沒藥外並為末入沒藥拌勻煉蜜和丸如梧桐

子大每服三十九以溫酒下不計時候

續斷飲 治產後腫重痛不可轉側

續斷

芎藭

桂

去粗皮

生乾地黃

焙

黃耆

細切

芍

藥

黃芩

當歸

去粗皮

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不

拘時候

芎藭湯

治產後腰痛沉重夫產後腎氣不足或惡露

所出未盡遇風寒客搏皆令氣脉凝滯留注於腰邪

正相擊故令腰痛也

芎藭

牛膝

去苗酒浸切焙

當歸

切炒

草薢

剉

桂

去粗皮

桃仁

湯浸去皮尖雙人炒

芍藥

各一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞入生薑三片棗二枚擘破同煎至七分去滓溫服不拘時候

芍藥湯 治產後氣血凝滯腰痛重痛

赤芍藥

延胡索

當歸

切焙

枳殼

去瓢麩炒

牛膝

去苗酒浸

炒 石斛

附子

炮裂去皮臍各一兩

右劉如麻豆大每服三錢水一盞入生薑三片棗二枚擘破同煎至七分去滓溫服不拘時候

附子丸 治產後腰疼不可忍

附子

炮裂去皮臍

人參

當歸

切焙

熟乾地黄

焙

桂

去粗

皮

延胡索

威靈仙

去苗土各一兩

右搗羅為末煉蜜為丸如彈子大每服一九細嚼溫酒下胡桃茶亦得不拘時候

當歸散 治產後腰痛不能轉側壯熱汗出身體急強

當歸

劉微炒

骨碎補

牛膝

去苗

赤芍藥

琥珀

桃

仁

湯浸去皮尖雙人麩炒微黃

芍藥

各一兩

右為細散食前以豆淋酒調下二錢

生地黃湯

療產後三日患腰疼腹中餘血未盡并手

脚疼不下食

生地黃

汁一升

芍藥

甘草

各二兩

丹參

四兩

蜜

一合

生薑

汁半合

右切以酒三升煮取一升去滓內地黃汁并蜜薑汁

微火煎一二沸，服三合，日二夜三，利一兩行，中間進食，與藥更進服。

熟乾地黄散 治產後氣血凝滯攻腰痛

熟乾地黄

焙三兩

當歸

切炒一兩半

細辛

去蘆葉三分

甘草

炙劉

吳茱萸

湯浸焙乾炒半兩

芍藥

各一兩

右搗羅為散，每服二錢，溫酒調下，不拘時候。

羚羊角散 治產後腰痛舉動不得

羚羊角

銹

紅藍花

牛膝

酒浸切焙剉各二兩

桂

去粗皮

芍

藥

各一兩

生乾地黃

焙四兩

右粗搗羅每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不

拘時候

治婦人產後遍身疼痛腰背不得轉側手足不得動搖
身熱頭疼若作傷寒醫遲則變生他病及婦人女子
遍身疼痛脚不能動

牛膝

酒浸炒

當歸

去蘆

白朮

黃耆

蜜炙

肉桂

不見火

獨活

去蘆頭

右各等分咬咀每服三錢水一盞半薑五片薤白七寸煎七分去滓熱服

敗醬散 療產後虛冷血氣流入腰腿痛不可轉或痛引腹中如錐刀所刺及疼痛

敗醬 當歸 各八分 川芎 芍藥 桂心 各六分

右咬咀以水二升煮取八合空心分溫二服忌葱一方有延胡索北五味各等分無芍藥入酒煎或水酒同煎

當歸黃耆湯 治產後失血過多脚腰痠疼轉側不得

壯熱汗出氣短心怔身強

當歸

劉煨

黃耆

劉細

芍藥

各二兩

生薑

切煨五兩

右粗搗篩入作八服每服水二盞半煎至一盞去

滓溫服

楮實丸 治一切風勞冷氣女人冷血氣產後腰痛等

證

楮實

一觔炒

牛膝

酒浸切煨

乾薑

炮各一兩

右搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每服食前空心
酒下二十九

生薑湯 療產後餘血不盡血流入腰脚疼痛胸滿氣

急兩脇痛

方見本門惡
露不盡類

治腹中惡露不除身強痛方

用生薑三斤咬咀以水一斗煮取三升分為三服當

下惡血

治產後腰痛起動不得方

萆薢 官桂 石斛 茯苓 兔絲子 芎藭

山茱萸 當歸 胡蘆芭

炒各一分 牛膝一兩

右杵羅為細末每服三錢水一盞入鹽少許同煎三四沸空心和滓熱喫

羊肉杜仲湯 治產後腰痛咳嗽

羊肉

四兩

杜仲

紫苑

當歸

桂心

白朮

各三兩

五味子

細辛

款冬花

人參

厚朴

芎藭

附子 萆薢

甘草

黃耆

各二兩

生薑

八兩

大棗

二枚

右咬咀以水二斗半煮肉取汁一斗五升去肉內藥
煎取三升半去滓分五服日三夜二

雙俱散 治產後腰痛

石菖蒲一兩當歸半兩

右為末每服三錢空心熱酒調下

普濟方卷三百五十一